UNOP

Boletín Informativo de la Unión de Ornitólogos del Perú

Vol. 5 Número 3 - diciembre 2010

ISSN 2220-9212

Índice

Φ Bibliografía aves 2009
Manuel A. Plenge. p. 3

Φ Descripción de las interacciones tróficas entre el cóndor andino *Vultur gryphus* **y otras especies por el consumo de carroña en el cañón del Colca, Arequipa.** Marcelo Stucchi y Judith Figueroa. p. 8

Φ Presencia de *Patagona gigas* **en el Valle Viejo de Tacna, Perú.** Sergio Jhonson K. Vizcarra & Andy J. Rosas. p15

Φ Observaciones sobre la nidificación del Fringilo apizarrado *Xenospingus concolor* **en Las Antillas de Paracas** Edgardo Aguilar & Oscar Gonzáles p. 17

Φ Propagación de *Tristerix sp.* **por cotingas en el Parque Nacional Huascarán**
Koky Castañeda Gil. p.21

Φ Registro más septentrional de reproducción de la gaviota dominicana *Larus dominicanus* **en el Perú.** Judith Figueroa . p 23

EDITORIAL

AÑO ORNITOLÓGICO

Con cierto retraso, les presentamos el tercer número del año 5 del boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP). Presentamos diversos artículos de interés que buscan, entre otros, difundir información relevante para la ciencia ornitológica en el país. Es necesario fomentar el ejercicio de escribir y presentar resultados de manera ordenada y continua. En esa dirección, desde esta tribuna deseamos fomentar que los investigadores en los temas que acá nos reúnen —y en otros que sean de interés también— escriban y adquieren este buen hábito.

Urge recopilar, ordenar y dar a conocer resultados científicos para poder tener información de calidad que nos ayude a tomar decisiones, a reforzar puntos de investigación débiles, a priorizar acciones de conservación y, en especial, a construir una buena base científica para gestionar nuestra diversidad biológica. En estos tiempos de crecimiento poblacional y del aumento de inversiones económicas en muchos campos productivos, es imprescindible poseer información de calidad que sirva de argumento para validar o discutir un desarrollo que, en la gran mayoría de casos, no contempla las variables ambientales que creemos deben respetarse y ser consideradas.

Este año el Perú será el escenario de dos importantes congresos sobre aves y uno de los resultados de antiguas reuniones de esta índole arroja una falta de información científica. Busquemos que dicha apreciación vaya quedando en el olvido.
Para finalizar, les comunicamos que el boletín ahora posee el ISSN lo que le confiere un mejor estatus, le otorga un reconocimiento internacional y permite una mejor identificación y mejora el acceso a este medio informativo.

No se olviden de revisar nuestro portal web: https://sites.google.com/site/boletinunop/ para aportar información y sugerencias que nos ayuden a mejorar este emprendimiento.

El Editor

Presencia de *Patagona gigas* en el Valle Viejo de Tacna, Perú

Jhonson K. Vizcarra1 & Andy J. Rosas2
1 Av. 28 de Agosto 1645, Urb. Leoncio Prado, Tacna, Perú
2 Hipólito Unanue 837, Cercado, Tacna, Perú
jhonsonvizcarra@yahoo.es

Resumen

En esta nota se realiza una descripción sobre la presencia ocasional de *Patagona gigas* en el Valle Viejo de Tacna. La observación de un ejemplar a 690 msnm, representaría el registro más bajo de esta especie en el sur del Perú, representando un aumento del rango altitudinal de 310 m y de 45 km en su rango de distribución en Perú.

Palabras clave: *Patagona gigas*, Valle Viejo de Tacna, Perú.

El Valle Viejo de Tacna se encuentra ubicado en la parte alta de la ciudad de Tacna, siguiendo el curso del Río Caplina entre los 640–1400 msnm (18º00'45''S 70º13'55''O–17º52'28''S 70º06'12''O). Comprende los distritos de Pocollay, Calana y Pachía en la provincia de Tacna. Los campos de cultivos son aprovechados para la siembra de verduras y hortalizas, además de especies frutales como ciruela (*Spondia spp.*), damasco (*Prunus americana*), durazno (P*runus persica*), guayaba (*Psidium guajaba*), higo (*Ficus carica*), manzana (*Malus sylvestris*), pera (*Pyrus communis*), uva (*Vitis vinífera*), entre otras. La vegetación del monte ribereño y cauces secos se encuentra conformada principalmente por *Equisetum giganteum, Piptadenia grata, Acacia macracantha, Geoffroea decorticans, Schinus molle, Nicotiana glauca, Tecoma fulva, Grindelia glutinosa, Pluchea chingoyo, Trixis cacalioides* y *Tessaria integrifolia.*

El 6 de Abril del 2007 se observó por primera vez un ejemplar de Patagona gigas alimentándose de las flores de T. fulva en el monte ribereño de Calientes (17º51'55''S 70º07'21''O; 1350 msnm) (Foto 1), en el distrito de Pachía.

Recientemente, el 24 de Agosto del 2010, se observó un ejemplar de *P. gigas* en el Fundo San José (17º53'33'S 70º08'01''O; 1120 msnm), en el distrito de Pachía. Posteriormente, el 31 de Agosto del 2010, otro ejemplar fue observado metros más abajo en el Pago Sobraya (18º00'45''S 70º12'15''O; 690 msnm), en el distrito de Pocollay. Finalmente, el 21 de Septiembre del 2010, se observó nuevamente un ejemplar en el Fundo San José. En todos estos casos, el ave estaba alimentándose de las flores de *N. glauca* y *T. fulva,* presentes en los terrenos llanos y áridos que colindan con los campos de cultivo.

En el Perú, esta especie es bastante común en la vertiente oeste de los Andes a partir de los 1000 msnm (Koepcke 1970; Clements & Shany 2001; Schulenberg et al. 2010). Los presentes avistamientos son los primeros registros de esta ave en este valle de Tacna (Vizcarra & Flores 2005) y representa una extensión de rango para la especie de 45 km suroeste.

Según la coloración del plumaje, todos los ejemplares observados corresponden a la subespecie peruviana, única raza que está presente en el Perú y en la precordillera del extremo norte de Chile (Fjeldså & Krabbe 1990; Martínez & González 2004; Jaramillo 2005).

El ejemplar observado en el distrito de Pocollay, representa el registro altitudinal más bajo en el sur del Perú. Es probable que estos individuos provengan de las zonas altas de Tacna, donde la especie es observada frecuentemente en valles interandinos entre los 3000–3500 msnm e incluso en bosques de queñoales (*Polylepis spp.*) por encima de los 4000 msnm (J. K. Vizcarra obs. pers.).

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Renzo Piana y Enrique Angulo por la revisión y sugerencias para mejorar el presente manuscrito.

Literatura Citada

Clements, J. F. & N. Shany. 2001. A field guide to the birds of Peru. Ibis Publishing Company. Temecula, California.

Fjeldså, J. & N. Krabbe. 1990. Birds of the high Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen and Apollo Books. Copenhagen and Svendborg.

Jaramillo, A. 2005. Aves de Chile. Lynx Edicions. Barcelona.

Koepcke, M. 1970. The birds of the Department of Lima, Peru. Livingston Publishing Company. Wynnewood, Pennsylvania.

Martínez, D. & G. González. 2004. Las aves de Chile. Nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista. Santiago.

Schulenberg, T. S., D. F. Stotz, D. F. Lane, J. P. O'Neill & T. A. Parker III. 2010. Aves de Perú. Serie Biodiversidad Corbidi 01. CORBIDI. Lima.

Vizcarra, J. K. & R. M. Flores. 2005. Avifauna del Valle Viejo de Tacna. En: Libro de Resúmenes del VI Congreso Nacional de Ornitología. Chiclayo, Perú. Pp. 141.

Andy J. Rosas

Foto 1. Ejemplar de *Patagona gigas* alimentándose de las flores de *Tecoma fulva* en el monte ribereño de Calientes, 6 de abril del 2007