Primer registro documentado de Calandria Tropical (*Mimus gilvus*) para el Perú

Walter Cuelo Pizarro
Waltercp04@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La Calandria Tropical (*Mimus gilvus*) se distribuye desde el sur de México hasta Panamá; y en Sudamérica, en Ecuador, Colombia, Venezuela; y por la costa atlántica, hasta el sur de Brasil (BirdLife International 2018). Es omnívoro y su dieta comprende una gran variedad de artrópodos, frutos pequeños y bayas, así como frutos sembrados como mango. Generalmente ocupa hábitats abiertos y arbustivos, bordes de bosque y sabanas; y es común en áreas disturbadas (Cody 2018). En esta nota presento el primer registro documentado de la especie para el Perú.

OBSERVACIONES

El 06 de agosto de 2017 a las 07 horas y 23 minutos observé y fotografié un individuo de *M. gilvus* (Fig. 1, 2 & 3) en el asentamiento humano San Pablo de la Luz, a orillas de la quebrada Felipe Caño, en las afueras de la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto (3°47'37.7"S/ 3°17'23.0"W, 112 m). El individuo estuvo posado en un árbol pequeño de 2.5 metros (m) de altura y luego descendió hasta el suelo. Al inicio, supuse que era un Zorzal de Pico Negro (*Turdus ignobilis*). Sin embargo, tras analizar el comportamiento, colores y sus características físicas, me percaté que se trataba de un individuo del género *Mimus*. Durante la observación no escuché ningún canto del ave ni algún canto que denote la presencia de otro individuo de la misma especie.

Figura N° 1: Vista trasera de *Mimus gilvus* en Felipe Caño, Iquitos – Loreto, el 06 de agosto de 2017. Foto: Walter Cuelo Pizarro.

Figura N° 2: Vista lateral derecho de *Mimus gilvus* en Felipe Caño, Iquitos- Loreto el 06 de agosto de 2017. Foto: Walter Cuelo Pizarro.

Figura N° 3: Mapa con los registros mencionados en el presente artículo. Los círculos amarillos son los registros en la frontera con Ecuador; EC-1: Nuevo Rocafuerte y EC-2: islas del río entre Tiputini, Nuevo Rocafuerte y Ballesteros. El círculo rojo es el registro en Colombia (CO): Vivero Municipal de Puerto Leguízamo; y los círculos celestes son los registros hechos en Perú; PE-1: Instituto Nacional de Innovación Agraria, PE-2: Registro presentado en este artículo. Los registros han sido tomados de eBird (2018) y el mapa fue hecho con Google Earth pro.

Cabe mencionar que existe un registro previo de Juan Díaz, quien observó un individuo de *M. gilvus*, el 20 de junio del 2017 a las 6 horas y 30 minutos, en las inmediaciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a 500 m del río Itaya (3°47'24''S/73°17'42''O, 98 m) en Iquitos (Fig. 3). El área era una zona deforestada, con la presencia de algunas palmeras de Aguaje (*Mauritia flexuosa*) y de viviendas de la población local. El individuo se encontraba aparentemente buscando alimento a nivel del suelo y fue observado por 15-20 minutos (eBird 2018).

DISCUSIÓN

Ambas observaciones y el registro fotográfico hecho por el autor de la nota constituyen la primera documentación de la presencia de *M. gilvus* para la parte baja del departamento de Loreto y para el Perú (Plenge 2018, Wiley *et al.* 2017). Con ello se eleva a 769 el número de especies confirmadas para este departamento (Wiley *et al*. 2017).

Es necesario agregar que *M. gilvus* ha sido reportado en dos oportunidades en la frontera con Ecuador. El primer registro es de Bruce Young, hecho el 12 de mayo

de 2017 en Nuevo Rocafuerte. El segundo corresponde al realizado por Jonas Nilsson, el 30 de agosto de 2016, en islas del río Napo, entre Tiputini, Nuevo Rocafuerte y Ballesteros (eBird 2018). Además, ha sido reportada en el lado colombiano del río Putumayo, en el Vivero Municipal de Puerto Leguízamo por Diego Rocha López, el 26 de abril de 2015 (eBird 2018) (Fig. 3).

El presente registro documentado (fotografiado) confirma la presencia de *M. gilvus* en el Perú y para Loreto. Se sugiere subir los próximos registros a eBird para conocer su estatus y distribución. Se recomienda a su vez indicar la cantidad de individuos avistados, a fin de conocer más sobre la especie y su distribución en el Perú.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios, a mi esposa y a mis padres por su constante apoyo incondicional. Agradezco de manera muy especial a Fernando Angulo por el apoyo brindado mediante información e ideas para el artículo y por la revisión del texto.

LITERATURA CITADA

BirdLife International (2018). Species factsheet: *Mimus gilvus*. Disponible: http://www.birdlife.org (Accedido el 20/02/2018).

Cody, M. (2018). Tropical Mockingbird (*Mimus gilvus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Disponible: https://www.hbw.com/node/58187 (Accedido el 20/02/2018).

eBird. (2018). eBird: Una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves [aplicación de internet]. eBird, Ithaca, New York. Disponible: http://www.ebird.org (Accedido el 20/02/2018).

Plenge, M. A. (2018). List of the birds of Peru / Lista de las aves del Perú. Unión de Ornitólogos del Perú. Disponible: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist (Accedido el 20/02/2018).

Wiley, R. H., Álvarez, A. J., Díaz, A. J. 2017. Aves de Loreto Bajo (60-250 msnm) / Birds of lowland Loreto (60-250 masl). Disponible: http://www.unc.edu/~rhwiley/pdfs/AvesLoretoBajo201708.pdf (Accedido el 20/02/2018).

Artículo recibido: 04/01/2018
Artículo aceptado: 03/03/2018
Artículo publicado: 14/03/2018