UNION ORNITOLOGICA DEL PERU (UNOP)

BOLETIN INFORMATIVO

VOLUMEN 2, NÚMERO 4 MAYO 2007

SECCIONES

AVES RAPACES DEL INTERIORDEL BOSQUE AMAZONICO PERUANO Ursula Valdez	1, 3
NOTA EDITORIAL Grace P. Servat	2
CUIDADO CON LOS NUEVOS REGISTROS: Falsas adiciones a la lista "oficial" de aves de la Zona Reservada de Tumbes. Tino Mischler	4-5
NOTICIAS Perú será sede del IX Congreso de Ornitología Neotropical el 2011	6
ANUNCIOS Convocatoria y formato para resúmenes del VII Congreso Nacional (Piura, Abril 27-30, 2008)	7

Aves rapaces del interior del bosque amazónico Peruano

por Ursula Valdez

De un total de aproximadamente 67 especies de aves rapaces (también conocidas como "aves de presa" o simplemente "rapaces") en el Perú, se sabe que al menos 22 viven o usan de alguna manera el interior del bosque amazónico de tierras bajas. Sin embargo muchas de estas aves son extremadamente sigilosas, muy difíciles de ver y ocurren en densidades muy bajas, razón por la que se sabe muy poco sobre ellas.

Aquí comparto algunas observaciones de rapaces en el bosque amazónico del sureste del Perú.

Sin duda, los halcones de monte (del genero *Micrastur*) --de las pocas especies de rapaces que usan como nidos cavidades inconspicuas y en árboles altos-- están entre las rapaces más difíciles de ver y en muchos casos se las considera raras. Sin embargo, los constantes registros de sus llamadas son una evidencia de que estas aves son más comunes de lo que se piensa. Sus llamadas no son los clásicos tonos agudos de otras rapaces sino sonidos semejantes a ladridos que empiezan antes de la primera luz del día y son de los primeros que pueden escucharse (a finales de Noviembre empiezan desde las 4:00 AM!) y también vocalizan antes del anochecer. Típicamente y previo al amanecer, uno puede empezar escuchando a un Halcón de monte barreteado (*M. ruficollis*) seguido de un Halcón de monte listado (*M. gilvicollis*) y unos segundo más tarde se escuchan al Halcón de monte acollarado (*M. semitorquatus*), Halcón de monte dorsigris (*M. mirandollei*) y al Halcón de monte de Buckley (*M. buckleyi*).

Micrastur ruficollis

M. gilvicollis


M. mirandollei

M. buckleyi

(Continúa en la página 3)

Aves rapaces del interior del bosque ... (viene de la pagina 1)

En más de una ocasión he podido escuchar a estas 5 especies vocalizando dentro del mismo radio de 300 m y dentro de un lapso de 10-15 minutos. El momento que empiezan a vocalizar parece estar determinado por la hora en que amanece, y este cambio se puede apreciar cuando los días empiezan a ser ligeramente más largos entre Noviembre y finales de Febrero y los halcones vocalizan aun más temprano. Aunque se puede escuchar a los halcones de monte durante otras horas del día, sus llamados son más predecibles antes del amanecer.

Leucopternis kuhli

Otro habitante misterioso de esta región es el Gavilán Cejiblanco (*Leucopternis kuhli*), el cual puede ser encontrado en bosques de *terra firme* y si se detecta visualmente es posible observarlo perchado en el subdosel por muchas horas, aunque es preciso anotar que raramente vocaliza. En contraste, el Gavilán Pizarroso (*Leucopternis schistacea*), es fácilmente detectado por sus constantes vocalizaciones que lo delatan en áreas inundadas o cercanas a arroyos, aguajales o bosques inundados.

En estratos mas altos del bosque encontramos al Gavilán Cabecigris (*Leptodon cayanensis*), al Águila Penachuda (*Spizaetus ornatus*) y al Águila Negra (*S. tyrannus*), lo que los hace difíciles de observar desde el piso del bosque; pero una vez más el conocimiento de sus llamados es clave para encontrarlos. Estas vocalizaciones son detectados durante el remonte de estas aves encima del dosel, y si uno esta cerca de un claro, no es raro verlos en parejas y haciendo piruetas de despliegue bastante espectaculares.

Spizaetus ornatus

Y para terminar, tengo que mencionar a las grandes águilas del bosque, el Águila Crestada (*Morphnus guianensis*) y el Aguila Harpía (*Harpia harpyja*) quienes generalmente habitan el dosel por encima de los 25-30m de altura. Estas águilas perchan en árboles emergentes y no remontan vuelo, entonces es más difícil verlas desde el interior del bosque o desde un claro, pero sus vocalizaciones y aleteos pesados y ruidosos las delatan muchas veces. En ocasiones perchan en bordes de ríos o lagos, y también hacen incursiones a estratos más bajos en busca de presas. Pongan atención la próxima vez que escuchen gran conmoción en una tropilla de monos, y los vean lanzarle al suelo cual lluvia de grandes frutos maduros cayendo de un árbol…hay un águila cerca!

Ursula Valdez, es estudiante en el Programa de Doctorado de la Universidad de Washington en Seattle. Su area de especialidad son las aves rapaces, para lo cual cuenta con una amplia experiencia en sistemas treopicales. Box 351800,Department of Biology, University of Washington, Seattle, WA 98195-1800
uvaldez@u.washington.edu