Vol. 9 Número 02 - 2014

Unión de Ornitólogos del Perú

UNOP

Boletín

https://sites.google.com/site/boletinunop/

Calandria de Ala Blanca (*Mimus triurus*). Foto: Omar Díaz.

INDICE

Sergio Nolazco, Amalia M. Sánchez & James J. Roper. (2014). Tamaño poblacional, distribución y ámbito de hogar de la Cortarrama Peruana (*Phytotoma raimondii*) en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, Lambayeque, Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 5-19 .

Willy Hernández (2014). Nuevos registros de aberraciones en la pigmentación del plumaje de aves marinas en el Perú de las familias Sulidae y Phalacrocoracidae. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 20-27.

Jhonson K. Vizcarra (2014). Descripción de un evento reproductivo y desarrollo de polluelos de *Phoenicopterus chilensis* en los Humedales de Ite, costa sur del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 28-39.

César Luque & Anthony Pauca (2014). Registro de Avefría Andina (*Vanellus resplendens*) en las Lomas de Atiquipa suroeste del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 40-44.

Jerico Solís & Juan Valqui (2014). Registro de un Aguilucho de Pecho Negro (*Geranoaetus melanoleucus*) alimentándose de un Zarcillo (*Larosterna inca*) en la costa central del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 45-48.

Jesús Cieza Ponce & Omar Díaz Villalobos (2014). Primer registro documentado del Calandria de Ala Blanca (*Mimus triurus*) en Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 49-51 .

Jacob R. Drucker & Blaine H. Carnes (2014). First and second documentation of Palm Warbler (*Setophaga palmarum*) in Peru. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 9 (2): 52-56.

Registro de Avefría Andina (*Vanellus resplendens*) en las Lomas de Atiquipa, suroeste del Perú

César Luque[1] & Anthony Pauca[2]

[1] Área de Ornitología, Museo de Historia Natural. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
Av. Alcides Carrión s/n, Arequipa, Perú.

[2] Instituto Científico Michael Owen Dillon
Av. Jorge Chávez 610, Cercado, Arequipa.

Autor para correspondencia: César Luque <cluquef@gmail.com>

RESUMEN

Se documenta un nuevo registro para las Lomas de Atiquipa en Arequipa: la Avefría Andina (*Vanellus resplendens*), basado en una observación realizada en octubre de 2013. Se considera una especie rara para la costa sur del Perú y particularmente para estas lomas.

Palabras clave: Avefría Andina, Lomas, Atiquipa, costa.

ABSTRACT

I document a new record for Lomas de Atiquipa in Arequipa: Andean Lapwing (*Vanellus resplendens*) based on an observation made in October 2013. We consider it a rare species for the Peruvian southern coast and particularly for Lomas habitat.

Key words: Andean Lapwing, Lomas, Atiquipa, coast.

INTRODUCCIÓN

La Avefría Andina (*Vanellus resplendens*) es un chorlo de los altos Andes, endémico del neotrópico, el cual posee una amplia distribución andina desde el sur e incluso al este de los Andes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, alcanzando el norte de Chile y Argentina (Capllonch & Quiroga 2013). Se encuentra generalmente en zonas altoandinas (encima de 3000 m) en ambientes húmedos como lagunas y ribera de ríos; y también puede ser encontrado en tierras agrícolas (Araya & Millie 2005, Johnson 2010).

Es un ave residente común y conspicua entre los 3000 y 4600 m, sin embargo, puede ser divagante raro en el invierno, hallándose en elevaciones más bajas e incluso en la costa. Así también, ha sido registrado ocasionalmente en el sur de la Amazonía (Piersma & Wiersma 1996, Schulenberg *et al*. 2010).

Por otro lado, las lomas de Atiquipa se ubican en la costa sur del Perú, en el litoral de la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, en las coordenadas (15º45'20''S, 74º22'34''O, 850 m). Pertenecen a las

comunidades campesinas de Jaqui, Yauca y Atiquipa. En la zona y en julio de 2011 fue establecida el Área de Conservación Privada (ACP) Lomas de Atiquipa (Fig.1).

Asimismo, en esta zona se puede observar la influencia del desierto árido del tablazo de Nazca y de la cordillera marítima que aparece sobre el litoral, la cual alcanza el punto más elevado (1297 m) en los cerros Cusihuaman y Cahuamarca (Canziani 1998). Estas lomas se encuentran en la Ecorregión del Desierto del Pacifico, según Brack (1986) y biogeográficamente en la Provincia Desértica de la Zona de Transición Sudamericana (Morrone 2014).

Las Lomas de Atiquipa tienen un área estimada de 22 800 ha (Canziani & Mujica 1997), siendo la de mayor superficie para este tipo de formaciones. Así también, destacan por ser una de las pocas lomas con presencia de bosques relictos de Tara (*Caesalpinia spinosa*), siendo estos los de mayor extensión y mejor estado de conservación del Perú. La estructura vegetal de estas lomas ofrece una gran variedad de hábitats que albergan una riqueza de especies y endemismos. Se ha registrado en el área la presencia de 62 especies de aves (Villegas *et al.* 2004). En esta nota se documenta una nueva localidad de distribución para la Avefría Andina en la costa del sur del Perú.

OBSERVACIÓN

El 30 de octubre de 2013 a las 13 horas se observó un individuo de esta especie en la zona árida del cerro Cusihuaman (15°45'11"S, 74°24'02"O, 1060 m), perteneciente a las Lomas de Atiquipa, a 5.5 km de la línea costera.

Figura 1. Mapa de referencia de las Lomas de Atiquipa y ACP Lomas de Atiquipa.

El individuo se encontraba escondido y vigilante mientras se alimentaba (Fig. 2). El hábitat donde fue observado estaba caracterizado por la presencia de dos especies vegetales dominantes: *Ambrosia fruticosa* y *Haageocereus decumbens*. La observación duró 20 minutos y fue hecha a 60 m sin binoculares. Cuando el ave se percató de nuestra presencia, se dirigió a refugiarse en la zona pedregosa para confundirse con el entorno. Se obtuvo el registro fotográfico y fílmico del individuo para la confirmación de su identificación.

Las características del individuo observado fueron: cabeza, cuello y pecho con plumaje de color gris claro, vientre blanco separado del pecho por una línea negra y alas de color verdoso con reflejos morados en las cobertoras. Asimismo presentaba alas primarias de color marrón, pico rosado intenso con la punta negra, patas y ojos de color rojizo y línea ocular negra bastante conspicua (Fig. 3).

Los datos obtenidos durante la observación de campo (notas, fotografías y filmaciones) fueron comparados con las características de identificación descritas por Canevari *et al.* (1991), Fjeldså & Krabbe (1990) y Schulenberg *et al.* (2010). Se concluyó que el individuo observado correspondía a un adulto de Avefría Andina.

Es importante resaltar que la Avefría Andina presenta una forma similar en vuelo a la Avefría del Sur (*V. chilensis*); sin embargo, esta última se diferencia por la presencia de una cresta. Asimismo, según Johnson (2010), estas especies no ocupan los mismos espacios, lo cual corroboraría la identificación de la especie que reportamos.

La presencia de la Avefría Andina en la costa sur del Perú se da como un evento irregular. Ha sido documentada por Hughes (1970, 1991) en los años 1954, 1956 y 1965 en la costa de Mollendo, considerándola como divagante de los altos Andes. Plenge

Figura 2. Individuo vigilante de la Avefría Andina *(Vanellus resplendens*) en el cerro Cusihuaman, en las Lomas de Atiquipa, octubre de 2013. Foto: César Luque.

Figura 3. Avefría Andina (*Vanellus resplendens*) en el cerro Cusihuaman, en las Lomas de Atiquipa, octubre de 2013. Foto: César Luque.

et al. (1989) reportó tres individuos cerca al río Pisco en 1982 y Vizcarra (2008, 2010) la registró en los humedales de Ite, especialmente en las estaciones de invierno y primavera de los años 2002 al 2007. Según eBird (2012) existen cinco registros para la costa norte – centro peruana (Ancash, Lima e Ica), siendo el registro más antiguo de 1986 en la Reserva Nacional de Paracas (Ica) y el más actual en el año 2012 en los humedales de Santa Rosa (Lima). También se tiene reportes de esta especie en la desembocadura del rio Lluta (Chile) que son considerados como accidentales por Peredo (2007) (Figura 4). Este es el primer registro de la Avefría Andina en las Lomas de Atiquipa y para este tipo de hábitat.



Figura 4. Distribución conocida del Avefría Andina incluyendo registros en la franja costera. Estrellas verdes representan registros anteriores, la estrella roja representa el registro de Atiquipa.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Comunidad Campesina de Atiquipa y al Instituto Regional de Ciencias Ambientales (IRECA), quienes con mucho esfuerzo lograron la conformación del Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa. Se agradece también al Comité Editorial del Boletín UNOP por las correcciones hechas al manuscrito.

LITERATURA CITADA

Araya B. & G. Millie. (2005) Guía de Campo de Las Aves de Chile (9ª edición). Editorial Universitaria. Chile.

Brack, A. (1986). Las Ecorregiones del Perú. Boletín de Lima 8: 57 - 70.

Canevari, M., Canevari, P., Carrizo, G. R., Harris, G., Rodríguez Mata, J. & R. J. Straneck. (1991). Nueva Guía de las Aves Argentinas. Tomo II: 194. Fundación ACINDAR. Buenos Aires, Argentina.

Canziani, J. (1998). Las Lomas de Atiquipa, un caso de paisaje cultural en la costa desértica del sur del Perú. En Paisajes culturales en los andes. Memoria Narrativa, Casos de Estudio, Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión de Expertos. UNESCO. Arequipa y Chivay, Perú.

Canziani, J. & E. Mujica. (1997). Atiquipa: un caso prehispánico de manejo sustentable en ecología de Lomas. En: Perú: El problema agrario en debate (E. González, B. Revesz & A. Tapia, Eds.). Seminario Permanente e Investigación Agraria VI, Lima – Perú, 503-526.

Capllonch, P. & O. Quiroga. (2013). Comentarios sobre la biología del Tero Serrano *Vanellus resplendens* (Aves: Charadriidae) en el noroeste de Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie 121:1-5.

eBird. (2012). eBird: Una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves [aplicación de internet]. eBird, Ithaca, New York. Disponible: http://www.ebird.org (Accedido: 31 octubre 2013).

Fjeldså, J. & N. Krabbe (1990). Birds of the High Andes. Zoological Museum. University of Copenhagen, Denmark. 876 pp.

Hughes, R. A. (1970). Notes on the birds of the Mollendo district, southwest Peru. Ibis, 112: 229-241.

Hughes, R. A. (1991). Las aves de la provincia de Islay. Boletín de Lima, 75: 47-54.

Johnson, T. (2010). Andean Lapwing (*Vanellus resplendens*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview? p_p_spp=144756

Morrone, J. (2014). Biogeographical regionalisation of the Neotropical region. Zootaxa, 3782: 1-110.

Peredo, R. (2007). La Desembocadura del Río Lluta: Un humedal para las aves, en el desierto costero de Chile. La Chiricoca, 2: 2-11.

Plenge M. A., Parker, T. A., Hughes, R. A. & J. P. O'Neill. (1989). Additional notes on the distribution of birds in west-central Peru. Gerfaut, 79: 55-68.

Piersma T. & P. Wiersma (1996). Family Charadriidae (Plovers). En: Handbook of the birds of the world, Vol. 3 (eds. del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J.) pp. 384-444. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona, España.

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P. & T. A. Parker III. (2010). Aves de Perú. Centro de Ornitología y Biodiversidad - CORBIDI, Lima, Perú, Serie Biodiversidad Corbidi 01: 1-660.

Villegas, L., Caballero, K. & H. Zeballos. (2004). Rol ecológico de la avifauna de las Lomas de Atiquipa, Arequipa. Dilloniana, 4:156-158.

Vizcarra, J. K. (2008). Composición y conservación de las aves en los humedales de Ite, suroeste del Perú. Boletín Chileno de Ornitología, 14: 59-80.

Vizcarra, J. K. (2010). Nuevos registros ornitológicos en los humedales de Ite y alrededores, Tacna, Perú. Biologist (Lima), 8: 1-20.

Artículo recibido: 06/11/2013
Artículo aceptado: 02/06/2014